

**Posiadacz zezwolenia:** Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej,  
ul. Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel. (22) 593-  
21-09, fax. (22) 593-21-11.

**Przestrzegaj instrukcji stosowania środka ochrony roślin  
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

**S I G N U M 33 W G**

**Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych**

Instrukcja stosowania środka ochrony roślin Signum 33 WG stanowi załącznik  
do zezwolenia MRiRW nr R - 2/2012/PE z dnia 10.04.2012 r.

**I STOSOWANIE ŚRODKA**

**Borówka wysoka**

Szara pleśń

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:** 1,5 kg/ha.

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:** 1,5 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek Signum 33 WG stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się objawów choroby. Do zwalczania szarej pleśni środek stosować od początku fazy kwitnienia borówki wysokiej.

Środek Signum 33 WG stosować przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania.

Środek Signum 33 WG stosuje się używając opryskiwaczy ogrodniczych i ręcznych.

**II ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

**1. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:**

Nie dotyczy.

**2. Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):**

Nie dotyczy.

**3. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):**

Borówka wysoka – 3 dni.

**4. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):**

Nie dotyczy.

**5. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:**

Nie dotyczy.

**6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN ORAZ ŚRODOWISKA**

W celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska wynikającego ze stosowania środka ochrony roślin Signum 33 WG do zwalczania szarej pleśni w borówce wysokiej odnoszą się:

- zapisy zawarte w etykiecie środka ochrony roślin Signum 33 WG stanowiącej załącznik do zezwolenia MRiRW Nr R – 33/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. na dopuszczenie środka ochrony roślin Signum 33 WG do obrotu.

oraz zapis:

- W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 50 metrów od zbiorników i cieków wodnych oraz redukcji znosu na poziomie 50%.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

**UWAGA!**

Odpowiedzialność za skuteczność działania środka ochrony roślin Signum 33 WG ponosi wyłącznie użytkownik stosujący środek ochrony roślin.