

LISTA ZASTOSOWAŃ SUBSTANCJI PODSTAWOWEJ

UPRAWA	ZWALCZANIE
drzewa owocowe: jabłoń domowa, śliwa domowa, brzoskwinia zwyczajna, porzeczka zwyczajna, orzech, wiśnia	mszyca brzoskwińniowa, bawełnica korówka, mszyca porzeczkowo-brzoskwińniowa, zdobniczka orzechowa, mszyca wiśniowa
fasola	mszyca burakowa
ziemniak	mszyca brzoskwińniowa
warzywa liściaste: sałata, kapusta	mszyce, np. mszyca kapuściana
bez koralowy	mszyca bżowa
róża	mszyca różano- szczeciowa
tawuła	mszyca tawułowa
kapustowate: kapusta, rzepak, rzepa zwyczajna	pchełka smużkowana, tantniś krzyżowiaczek
jabłoń, grusza	owocówka jabłkóweczka
fasola	przędziorek chmielowiec
winorośl właściwa	przędziorek chmielowiec, przędziorek szklarniowiec
kapustowate: kapusta, gorczyca, rzodkiew zwyczajna	<i>Alternaria sp.</i>
dyniowate: ogórek siewny	mączniak prawdziwy - <i>Erisiphe polygoni</i> , <i>Alternaria alternata</i>
drzewa owocowe: jabłoń domowa, śliwa domowa, brzoskwinia zwyczajna, czereśnia	<i>Alternaria alternata</i> , paciornica pestkowcowa - <i>Monilinia laxa</i> , gronowiec szary - <i>Botrytis cinerea</i> , rozłożeń czerniejący - <i>Rhizopus stolonifer</i>
winorośl właściwa	drzewik - <i>Plasmopara viticola</i>
ziemniak	zaraza ziemniaka - <i>Phytophthora infestans</i>

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1107/2009 zezwala się na stosowanie sfermentowanego wyciągu z pokrzywy *Urtica* spp. jako SUBSTANCJI PODSTAWOWEJ w charakterze środka owadobójczego, grzybobójczego i roztoczebójczego. Stosowanie musi być zgodne z warunkami określonymi w sprawozdaniu SANTE/11809/2016-rev.0.1

Producent:
Torfowisko Biały Bór Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 37, 84-241 Gościcino
Data produkcji i nr partii: 03.2020

Masa netto / zawartość netto:

1 kg / 1 L

Okres ważności:
3 lata od daty produkcji



POKRZYWA
stymulator wzrostu



ZWALCZA SZKODNIKI, MSZYCE



ZWALCZA CHOROBY



KOMPLEKSOWA OCHRONA ROŚLIN



LEPSZE UKORZENIE



PODLEWANIE I OPRYSK



POKRZYWA. Stymulator wzrostu. Koncentrat

Decyzja MRiRW nr S-699/17 z dnia 15.11.2017 r.

Zakres stosowania

Stymulator wzrostu pn.: „POKRZYWA. Stymulator wzrostu. Koncentrat” przeznaczony jest do stosowania w uprawach roślin ozdobnych i warzyw w warunkach polowych i pod osłonami. Środek może być stosowany w okresie wegetacji do podlewania lub opryskiwania roślin. Ekstrakt z pokrzywy stosuje się w celu lepszego ukorzenia się roślin, oraz w czasie wzrostu - do poprawy ich jakości.

Dawk, sposób i terminy stosowania

Podlewanie roślin:

Zalecane stężenie 50-100 ml środka w 1 litrze wody, w zależności od wielkości roślin. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 50-100 ml na roślinę, w zależności od wielkości roślin. Podlewać co 10-14 dni, pierwsze podlanie bezpośrednio po sadzeniu roślin.

Opryskiwanie roślin:

Zalecane stężenie 25-50 ml środka w 1 litrze wody. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 5-10 litrów na 100 m², w zależności od wielkości i zagęszczenia roślin. Zabieg wykonywać co 10-14 dni przez cały okres wegetacji.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Odmierzoną ilość stymulatora wlać do zbiornika z wodą i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Uwaga:

Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin.

Przechowywanie

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 5-25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Środki ostrożności

Zabezpieczyć przed przypadkowym spożyciem.

Podczas stosowania zachować podstawowe środki ostrożności.

W przypadku dostania się środka do oczu przemyć je czystą wodą.

Używać odzieży ochronną, a po wykonaniu wszelkich czynności umyć ręce.

Wymagania jakościowe:

- wartość pH w H₂O- 6,8- 7,8
- zawartość węgla organicznego, co najmniej- 25,0% (s.m.)
- postać- płynna, zawiesina